

## **ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α, ΟΞΕΙΑ**

### Κλινική περιγραφή

Κλινική εικόνα συμβατή με οξεία ηπατίτιδα, π.χ. ίκτερος ή αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών του ορού, με διακριτή έναρξη των εκδηλώσεων.

### Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

- Θετική δοκιμασία ελέγχου για IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (IgM anti-HAV).
- Ανίχνευση του αντιγόνου του ιού στα κόπρανα.
- Ανίχνευση του νουκλεϊνικού οξέος του ιού στον ορό (HAV RNA).

### Κατάταξη του κρούσματος

#### **Πιθανό**

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιδημιολογική σύνδεση.

#### **Επιβεβαιωμένο**

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

### Σημείωση

Στον ορισμό κρούσματος για επιδημιολογική επιτήρηση δεν περιλαμβάνονται τα ασυμπτωματικά άτομα με θετικό anti-HAV IgM.