



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης
Γραφείο Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΙΛΑΡΑΣ

Κλινικός ορισμός κρούσματος

Κλινική εικόνα που περιλαμβάνει γενικευμένο εξάνθημα διάρκειας >3 ημέρες και θερμοκρασία >38⁰ C και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: βήχας, ρινική καταρροή, κηλίδες Koplik, επιπεφυκίτιδα.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

- Ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι του ιού της ιλαράς, χωρίς να έχει γίνει πρόσφατος εμβολιασμός.
- Αύξηση του τίτλου των ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού της ιλαράς, χωρίς να έχει γίνει πρόσφατος εμβολιασμός.
- Ανίχνευση του ιού της ιλαράς (όχι των στελεχών του εμβολίου) σε κλινικό δείγμα.

Κατάταξη του κρούσματος

Ενδεχόμενο

Κρούσμα που έχει διαγνωστεί από ιατρό ως ιλαρά.

Πιθανό

Κρούσμα με εκδηλώσεις που εμπίπτουν στον κλινικό ορισμό (χωρίς επιδημιολογική σύνδεση).

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα που έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ή κρούσμα με εκδηλώσεις που εμπίπτουν στον κλινικό ορισμό και έχει επιδημιολογική σύνδεση. Ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν είναι απαραίτητο να έχει εκδηλώσεις που εμπίπτουν στον κλινικό ορισμό της νόσου.