

Налазите се у опасности да се заразите:

ХЕПАТИТИС А

- Тесним контактом са зараженом особом (н.пр. чланом породице или сексуалним партнером болесника)
- Од заразених комуналних простора (н.пр. W.C-и)
- Зараженом водом, живим прехранбеним производима опраним зараженом водом или неводољно куваном храном спремном од заражене особе)

ХЕПАТИТИС В

- Сексуалним контактом са зараженом особом
- Заразеним крвљу предметима (н.пр. шприцевима, жилетима, четкама за зубе, иглама)
- Контактном са крвом оболене особе у породици
- Од заражене мајке (одојчади, за време порођаја)
- Зараженом крвљу или крвним производима датим пре 1975ег. (изванредно ретко сада због систематске контроле у давању крви)
- НЕ преноси се водом, храном, опремом за кување, W.C- има, или друштвеним контактом (руковањем, загрљајем, пољубцем, кашљањем, кијањем)

ХЕПАТИТИС С

- Заразеним крвљу предметима (н.пр. шприцевима, жилетима, четкама за зубе, иглама)
- Зараженом крвљу или крвним производима датим пре 1975ег. (изванредно ретко сада због систематске контроле у давању крви)
- Ретко сексуалним контактом са зараженом особом
- Ретко од заражене мајке (одојчади, за време порођаја)
- НЕ преноси се водом, храном, опремом за кување, W.C- има, или друштвеним контактом (руковањем, загрљајем, пољубцем, кашљањем, кијањем)



КАКО ДА СЕ ШТИТИТЕ?

ХЕПАТИТИС А


- водећи строга правила личне хигијене (н.пр. прање рука после употребе W.C.-а и пре припреме и трошње јела)
- вакцинацијом у одређеним случајевима (н.пр. пре поласка у земље са великом ендемичношћу, хронично болесници од хепатитиса)

ХЕПАТИТИС В

- Употребом презерватива у току сексуалног контакта
- Не дели са другима шприцеве, маказе, алате за сећање ноката или личне ствари (н. пр. четке за зубе, жилете)
- Проверити да се употребљавају стерилизовани алати пре маникира, пукнцијом, тетовирања, бодена тачака тела итд.
- Вакцинацијом

ХЕПАТИТИС С

- Не дели са другима шприцеве, маказе, алате за сећање ноката или личне ствари (н. пр. четке за зубе, жилете)
- Проверити да се употребљавају стерилизовани алати пре маникира, пукнцијом, тетовирања, бодена тачака тела итд.
- Употребом презерватива у току сексуалног контакта, ако има привремених или више сексуалних партнера. Не препоручује се обавезно употреба презерватива код моногамских парова (н.пр. супружници)
- Вакцина за хепатитис С не постоји



УЧИ

колико се налазиш у опасности,
како да се штитиш

ГОНИ

твоје сумње,
обичним тестом крви, сада!

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ СПЕЦИЈАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА (Ц.К.С.И.),
МИНИСТАРСТВО ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИАЛНУ СОЛИДАРНОСТ,
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈУ У УНИЈИ, КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ХЕПАТИТИСЕ
Зис Септемвриу 54, 104 33 Атина, тел. 210-8899000, 210- 8899237, 210-8899248, факс 210-8899240

НАЦИОНАЛНИ
ПРОГРАМ
ВИРУСНОГ
ХЕПАТИТИСА



ХЕПАТИТИС

(ЗАПАЉЕЊЕ ЈЕТРЕ)



у свим узрастима, у разним местима,
у многим активностима

Једна
НЕВИЉИВА
ОПАСНОСТ

НАЦИОНАЛНИ
ПРОГРАМ
ВИРУСНОГ
ХЕПАТИТИСА



Учи
и штити се